

أعزائي أفراد الأسرة:

يجوز أن يكون طفلكم قد تعرّض لعدوى الحُمَاق - جدري الماء (Chicken Pox) في Head Start (هيد ستارت)/مركز ECEAP (برنامج التعليم المبكر للأطفال والإعانة). وهذه العدوى مرض فيروسي معدٍ يرافقه طفح جلدي.

ما هي الأعراض؟ حمّى وحدّة الطبع وطفح جلدي محكاك شديد يتحول إلى بثور. يظهر أولاً في الجسم ثم على الوجه. تتكون جلبة داكنة بعد يوم أو يومين بعد تقشّر النفاط (الحطاطات).

كيف تنتشر العدوى؟ بسهولة. إفراز من الأنف والحنجرة وبثور الجلد من شخص مصاب.

متى تبدأ ظهور الأعراض؟ في ظرف أسبوعين إلى 3 أسابيع بعد التعرّض إلى الفيروس.

هل يتطلب إبقاء الطفل في البيت؟ نعم، حتى يصبح على كل البقع قشور عليها (ويكون ذلك عادة في 7 أيام) وزوال الحمّى (الحرارة).

ينبغي تجنّب تناول الأسبرين - يجب تناول الأدوية الخالية من الأسبرين مثل تايلنول (Tylenol).

يرجى إخطار مقدم الرعاية الصحية المسؤول عن طفلكم وبرنامج Head Start (هيد ستارت)/مركز ECEAP (برنامج التعليم المبكر للأطفال والإعانة) الذي يذهب إليه طفلكم عندما تظهر مثل هذه الأعراض على طفلكم.

إذا كنتِ حاملاً أو كانت امرأة أخرى حاملاً تحتك بشكل وثيق بطفلكم، فينبغي عليكِ أو على تلك المرأة الحامل الاتصال بالطبيب أيضاً.

هاتف:

الموظف:

المركز: