

أعزائي أفراد الأسرة:

من المحتمل أن يكون طفلكم قد تعرض لعدوى قمل الرأس (**Head Lice**) في برنامج Head Start (هيد ستارت)/مركز ECEAP (برنامج التعليم المبكر للأطفال والإعانة). حشرات سمراء بحجم النمل الصغير تتغذى على دم فروة الرأس.

ما هي الأعراض؟ حك فروة الرأس و/أو الرقبة. الأشياء التي ينبغي عليك التفتيش عنها هي وجود بقع بيضاء صغيرة جداً على الشعر. وهذه هي الصئبان أو البيض التي تفقس القمل. وهي قطع بيضاء صغيرة جداً بشكل حبوب اللوز الصغيرة تتعلق بقوة بالشعر على نحو قريب جداً إلى فروة الرأس. وتبدو كأنها مثل قشرة الرأس إلا أنه من المستحيل نفضها بأصبعك. ولكي تتخلص منها، عليك أن توقعها في فخ بين أطراف أصبعك وتمشطها فعلاً من ساق الشعرة.

كيف ينتشر القمل؟ الاحتكاك المباشر بشعر شخص مصاب. المشاركة في استخدام أمشاط أو فرش الشعر أو القبعات أو البطانيات أو الشراشف. تخزين الأشياء الملوثة مع الأشياء النظيفة.

متى تبدأ ظهور الأعراض؟ في ظرف يوم واحد إلى 5 أيام بعد التعرض لأشخاص مصابين أو الأشياء الملوثة.

هل يتطلب إبقاء الطفل في البيت؟ نعم، حتى ينتهي العلاج أو حتى يتم إزالة كافة الصئبان (البيض) من ساق الشعرة.

إذا كنت تشبه أن طفلكم يعاني من القمل، فعليك أن تتصل بمقدم الرعاية الصحية المسؤول عن طفلكم للمشورة بشأن العلاج وإخطار معلم(ة) طفلكم في برنامج Head Start (هيد ستارت)/مركز ECEAP (برنامج التعليم المبكر للأطفال والإعانة) بذلك. يرجى أن تفحص طفلكم كل أسبوع لمدة شهر واحد. فتش بكل انتباه خصوصاً في المناطق الواقعة خلف وفوق الإذنين وفي ظهر الرقبة.

هاتف:

الموظف:

المركز: