

أعزائي أفراد الأسرة:

يجوز أن يكون قد تعرّض طفلكم لعدوى العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA). عدوى جرثومية تصيب الجلد.

ما هي الأعراض؟ ألم واحمرار وتورّم وسائل أو قيح في المنطقة المصابة.

كيف تنتشر العدوى؟ نزح سائلي من شخص مصاب أو أشياء ملوثة يصل إلى تحت جلد شخص غير مصاب (جرح، خدش). تشجيع الأطفال على غسل أيديهم وتجنب الاحتكاك بجروح الأشخاص الآخرين أو أشياءهم الشخصية..

متى تبدأ ظهور الأعراض؟ في ظرف أسابيع إلى أشهر بعد التعرّض للعدوى.

هل يتطلب إبقاء الطفل في البيت؟ نعم، حتى يتم احتواء النزح بضمادة جافة ونظيفة مع إعطاء ملاحظة خطية من مقدم الرعاية الطبية.

إذا كان طفلكم يعاني من هذه الأعراض، فيجب عليكم إخطار مقدم الرعاية الصحية المسؤول عن طفلكم للحصول للعلاج اللازم. إذا تمّ تشخيص طفلكم بـ MRSA، فيرجى إخطار برنامج Head Start (هيد ستارت)/مركز ECEAP (برنامج التعليم المبكر للأطفال والإعانة) التابع له بذلك.

هاتف:

الموظف:

المركز: