



أعزائي أفراد الأسرة:

يجوز أن يكون قد تعرض طفلكم إلى عدوى الجرب (**Scabies**) في برنامج Head Start (هيد ستارت)/مركز ECEAP (برنامج التعليم المبكر للأطفال والإعانة). يسبب الجرب سوسة صغيرة جداً من الصعب جداً رؤيتها تحت المجهر.

ما هي الأعراض؟ طفح جلدي صغير أحمر في وتر الأصابع والرسغ والساعدين والمرفقين وداخل الفخذين والخصر والكاحلين وحكة شديدة تشتد حذتها في الليل.

كيف تنتشر العدوى؟ احتكاك شخص بشخص آخر. مشاركة الفراش أو المناشف أو الملابس.

متى تبدأ ظهور الأعراض؟ عدة أيام إلى 6 أسابيع بعد التعرض لشخص مصاب أو أشياء ملوثة.

هل يتطلب إبقاء الطفل في البيت؟ نعم، يجوز للطفل أن يرجع إلى المدرسة بعد الانتهاء من العلاج.

إذا كنت تشك أن طفلكم يعاني من الجرب، فعليك أن تتصل بمقدم الرعاية الصحية المسؤول عن طفلكم للمشورة بشأن العلاج وإخطار معلم(ة) طفلكم في برنامج Head Start (هيد ستارت)/مركز ECEAP (برنامج التعليم المبكر للأطفال والإعانة) بذلك.

هاتف:

الموظف:

المركز: